

# Міністэрства аховы здароўя дало рэкамендацыі па аказанні меддапамогі пацыентам з COVID-19



Фота з архіва

Міністэрства аховы здароўя дало часовыя рэкамендацыі па арганізацыі аказання медыцынскай дапамогі пацыентам з інфекцыяй COVID-19. Гэта прадугледжана загадам Міністэрства аховы здароўя ад 1 ліпеня 2020 года, паведамляе БЕЛТА.

Рэкамендацыі падрыхтаваны на падставе практычнага вопыту аказання медыцынскай дапамогі пацыентам з інфекцыяй COVID-19 адносна дыягностыкі, лячэння і маршрутызацыі пацыентаў, улічваючы рэкамендацыі СААЗ, замежныя навуковыя публікацыі і матэрыялы.

У іх, у прыватнасці, вызначана, якая катэгорыя пацыентаў абавязкова шпіталізуецца з сартаваннем на ўзроўні прыёмнага аддзялення (накіраванне ў агульнасаматычнае аддзяленне або ў аддзяленне анестэзіялогіі і рэанімацыі). Размова ідзе аб сярэднецяжкай і цяжкай інфекцыі COVID-19 (або падазрэнні на інфекцыю), пры наяўнасці фактараў рызыкі і (або) неабходнасці назначэння лекавага сродку гідраксіхларахін. Таксама гэта датычыцца пацыентаў з вострым рэспіраторным дыстрэс-сіндромам з інфекцыяй COVID-19.

Пацыентам з сярэднецяжкай формай інфекцыі без фактараў, што ўскладняюць ход пнеўманіі, медыцынская дапамога можа аказвацца дома пры забеспячэнні дынамічнага нагляду.

Вызначаны парадак вядзення пацыентаў з інфекцыяй COVID-19 у аддзяленнях анестэзіялогіі і рэанімацыі бальніц, а таксама на амбулаторным этапе.

У рэкамендацыях агавораны парадак назначэння лекавых сродкаў у амбулаторных умовах. У прыватнасці, назначэнне фавіпіравіра рэкамендавана пацыентам з сярэднецяжкім ходам інфекцыі COVID-19 і ажыццяўляецца з дапамогай правядзення медычнага кансіліуму і пры ўмове інфармаванай згоды пацыента або яго законных прадстаўнікоў са строгім кантролем бяспекі лячэння.

Таксама распрацавана інструкцыя аб парадку арганізацыі эпідэміялагічнага расследавання выпадкаў інфекцыі COVID-19, медыцынскага нагляду і аказання медыцынскай дапамогі кантактам I і II узроўняў па інфекцыі COVID-19.

БЕЛТА