



## Вакцинация – эффективная мера профилактики!




С целью снижения и регистрации гриппа и ОРВИ среди населения, вакцинацию необходимо делать за 2-3 месяца до начала роста заболеваемости.

В первую очередь, защита от гриппа важна для групп высокого риска:

- детей в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет;
- детей от 3-х лет и взрослых с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями;
- лиц в возрасте старше 65 лет;
- беременных женщин;
- медицинских и фармацевтических работников;
- детей и взрослых, находящихся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания;
- работникам сфер – образования, торговли, общественного питания, коммунальной сферы, правоохранительных органов.

### Вакцинацию от гриппа можно сделать вакцинами:



«Вакцина для профилактики гриппа»,  
Россия, г. Санкт Петербург



«Ваксигрип Тетра», «Sanofi  
Pasteur S.A.» Франция



«Инфлювак Тетра», ABBOTT  
BIOLOGICALS, B.V. Нидерланды

**Напомним**, допускается совместное (в один день) применение вакцин против гриппа и COVID-19, а также интервальное – через 2 недели (между введением вакцин).

**Вакцинация остается единственной эффективной мерой защиты населения и приводит к существенному сокращению заболеваемости и неблагоприятному исходу заболеваний.**

